

ПРОКТАЛУРОН

«ОДОБРЕНО»
ГУП «Государственный центр экспертизы
и стандартизации лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и
медицинской техники» Агентства по развитию
фармацевтической отрасли при
Министерстве Здравоохранения
Республики Узбекистан
№19 от 11.10.2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Торговое название препарата:
Прокталурон

Действующее вещество (МНН):
гиалуроновая кислота

Лекарственная форма:
суппозитории ректальные

Состав:

Каждый суппозиторий содержит:
Натрия гиалуронат
(эквивалентно кислоте гиалуроновой)... 5.90 мг (5.00 мг)
Massa suppositoire A
(твердый жир/полусинтетические глицериды)... 1847,70 мг
Масляный экстракт центеллы азиатской..... 20,00 мг
Жирорастворимый экстракт алоэ 60,00 мг
Масляный экстракт календулы 60,00 мг
Эфирное масло чайного дерева 2,00 мг
Бутилированный гидрокситолуол (БГТ) 0,40 мг
Пропилпарагидроксibenзоат 1,00 мг
Изобутилпарагидроксibenзоат 1,00 мг
Бутилпарагидроксibenзоат 2,00 мг

Описание:

белые или почти белые суппозитории без запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

Стимулятор трофики тканей и регенерации.

Код АТХ: C05AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Механизм действия

Гиалуроновая кислота является мукополисахаридом, природным полимером, который является важным компонентом межклеточной соединительной ткани. Её физические и химические свойства способствуют взаимодействию с другими молекулами и клетками, что делает участие гиалуроновой кислоты чрезвычайно важным в ряде биологических процессов. Гиалуроновая кислота вступает в реакцию с молекулами и играет важную роль в поддержании тонуса и эластичности кожи. Совместно молекулами протеогликанов гиалуроновая кислота стабилизирует межклеточную массу соединительной ткани. Физико- химические свойства гиалуроновой кислоты в области ранения создают физиологические условия, которые способствуют заживлению.

Является фактором поддержки для быстрого восстановления слизистой аноректального канала.

Показания к применению

Для восстановления аноректального канала после хирургического вмешательства, при внутреннем и наружном геморрое, воспалении анального кольца (в том числе при трещинах и анальном свище), а также после процедуры облучения при лечении рака простаты.

Способ применения и дозы

Ректально. Продолжительность применения обычно составляет 30 дней, но может быть продлена в соответствии с указаниями врача.

Перед введением необходимо вымыть руки, освободить ректальные свечи (разрезав ножницами упаковку). Вводить ректальные свечи в задний проход предпочтительно после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника. Если ректальные свечи слишком мягкие, необходимо предварительно охладить их в холодильнике в течение нескольких минут или подержать под холодной водой (до извлечения их из пластиковой упаковки). Обычная дозировка составляет одна ректальная свеча в день, вечером перед сном (или согласно указаниям врача). Нельзя принимать внутрь.

Побочные действия

Серьезные побочные эффекты не отмечались.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Лекарственные взаимодействия

Не наблюдалось.

Особые указания

При длительном применении средства, предназначенного для местного использования, может развиться симптомы гиперчувствительности, в этом случае необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом. Избегайте контакта с глазами.

Применение при беременности и период лактации

В связи с недостаточным опытом применения, при беременности ректальные свечи Прокталурон необходимо применять только по рекомендации врача.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не влияет на способность пациента к управлению автотранспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска

По 5 ректальных суппозиториях в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлорида и полиэтилена.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную упаковку.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения

Spey Medical Ltd., Великобритания

Производитель

HELP S.A.

10 Valaoritou Str., GR 14452 Metamorphosis, Attica, Греция

Т.: (0030) 2102815353

Факс: (0030) 2102811850

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству изделия медицинского назначения на территории Республики Узбекистан

ООО "Ameliya Pharm Service",
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Ойбек, 36,
БЦ «EAST LINE»

Тел.: +998 71 150 50 81; +998 71 150 50 82;

E-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk